



නව නිර්දේශිත බෝග ප්‍රභේද - 2015

2015 නොවැම්බර් මස 19 වන දින ගන්නොරුව සේවා සංස්කරණ අභ්‍යන්තර ආයතනයේදී පැවති නව බෝග ප්‍රභේද නිදහස් කිරීමේ කමිටු රැස්වීමේදී පහත සඳහන් නව ප්‍රභේද මෙරට වගාවන් සඳහා නිර්දේශ කරන ලදී.

ඒ

ප්‍රභේදයේ නම : At 311



ලක්ෂණ :

- ▶ වයස - මාස 03.
- ▶ රතු බාස්මති කාණ්ඩයට අයත් විශේෂයකි.
- ▶ සාමාන්‍ය අස්වැන්න හෙක්ටයාරයට ටොන් 5.6 ක් වේ.
- ▶ ඇඳු වැටීමක් නැත. කරලක බෝල් ප්‍රමාණය 7% ක් පමණ වන අතර අස්වනු නෙළීමේදී බීජ හැලීම 1% පමණ වේ.
- ▶ බත පිසීමේදී සහල් සහ ජලය සම පරිමාවට යෙදීමෙන් නොඇලෙන සුළු බතක් සපයයි. පිසූ බත ප්‍රසන්න සුවඳකින් යුක්තය.
- ▶ පෝෂණ ගුණයෙන් අනුනගය. අඩු ග්ලයිසෙමික් අගයක් සහිතය.

- ▶ කොළ පාච්ච, බැක්ටීරියා අංගමාරයට, දුඹුරු පැළ කිඩා හානියට හා ගොක් මැස්සාට මධ්‍යස්ථව ප්‍රතිරෝධීය.
- ▶ දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක වගාවට නිර්දේශ කර ඇත.

වෙනත්

ප්‍රභේදයේ නම : ANKG 2

භාවිතා කරන නම : ලංකා ජම්බො



ලක්ෂණ :

- ▶ සාමාන්‍ය අස්වැන්න හෙක්ටයාරයට මෙවුක් ටොන් 2.5 - 3.0 ක් වේ.
- ▶ අස්වනු නෙලීම සඳහා දින 110 - 115 කාලයක් ගතවේ.
- ▶ බීජ 100 ක බර ග්‍රෑම් 75 - 78 වේ.
- ▶ කරලක අඩංගු බීජ ප්‍රමාණය දෙකකි.
- ▶ විශාල බීජ සහිත රට කපු ප්‍රභේදයක් වන මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ මාස 3 1/2 ක පමණ කාලයක් තුළදී අස්වැන්න නෙලා ගැනීමට ඇති හැකියාවයි.



ලක්ෂණ :

- ▶ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශිත ප්‍රථම දෙමුහුම් මිරිස් ප්‍රභේදය වේ.
- ▶ අමු මිරිස් සඳහා යෝග්‍ය ප්‍රභේදයකි.
- ▶ වියළි මිරිස් සඳහා ද යෝග්‍යය. නමුත් අමු මිරිස් හා වියළි මිරිස් අතර අනුපාතය 5:1 කි
- ▶ විභව අමු මිරිස් අස්වැන්න හෙක්ටයාරයට මෙට්‍රික් ටොන් 32 කි.
- ▶ සාමාන්‍ය අස්වැන්න හෙක්ටයාරයට මෙට්‍රික් ටොන් 25 කට වැඩිය.
- ▶ මිරිස් කොළ කොඩිවීමේ සංකීර්ණයට හා පිපිඤ්ඤා විචිත්‍ර වෛරසය සඳහා මධ්‍යස්ථ ප්‍රතිරෝධී වේ.
- ▶ කරලක දිග සෙන්ටිමීටර් 10 - 13 ක් වන අතර පළල සෙන්ටිමීටර් 1.58 ක් වේ.
- ▶ මල් පිපීමට ගතවන කාලය දින 65 - 75 කි.
- ▶ සිටුවීම සඳහා යෝග්‍ය පරතරය සෙන්ටිමීටර් 60 X 45 කි.
- ▶ එක් වළක එක් පැළය බැගින් සිටුවීම යෝග්‍යය.



ලක්ෂණ :

- ▶ ආකර්ශනීය පෙනුමක් ඇති දෙමුහුම් ප්‍රභේදයකි.
- ▶ පිටත ආවරණය ලා කොළ පැහැතිය.
- ▶ දිළිසෙන සුළු මතුපිටක් ඇත.
- ▶ කටු රහිත සුමට දාර සහිත බැවින් ඇසිරීමට හා ප්‍රවාහනයට පහසුය.
- ▶ ආනයනික කරවිල ප්‍රභේද හා තරඟකාරී අස්වැන්නක් ලබා දේ.
- ▶ සාමාන්‍ය අස්වැන්න හෙක්ටයාරයට මෙට්‍රික් ටොන් 15 - 20 පමණ වේ.
- ▶ කරලක බර ග්‍රෑම් 200 - ග්‍රෑම් 250 අතර වේ.

පාල වග්ග

ප්‍රභේදයේ නම : ගන්නොරුව හයිබ්‍රිඩ්
කැප්සිකම් 1

භාවිතා කරන නම : ගන්නොරුව පුර්වතා



ලක්ෂණ :

- ▶ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රථමයෙන්ම නිර්දේශ කළ දෙමුහුම් මාළු මිරිස් ප්‍රභේදයයි.
- ▶ හෙක්ටයාරයකට වෙන් 21 ට වැඩි අස්වැන්නක් ලැබේ.
- ▶ කරලක බර ග්‍රෑම් 37 කි.
- ▶ දිළිසෙන සුළු කොළ පැහැයක් ගනී.
- ▶ සැර ගතිය වැඩිය.
- ▶ බැක්ටීරියානු හිටු මැරීමේ රෝගයට මධ්‍යස්ථ ලෙස ප්‍රතිරෝධී වේ.
- ▶ වෙළෙඳපොළ ඉල්ලුමක් ඇති දික් ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයක් ගනී.

මැ

ප්‍රභේදයේ නම : ගන්නොරුව මස්ක් මැ

භාවිතා කරන නම : ගන්නොරුව A9 මැ



ලක්ෂණ :

- ▶ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිකුත් කරන ලද ප්‍රථම දෙමුහුම් මැ ප්‍රභේදයයි.
- ▶ හෙක්ටයාරයකට වෙන් 21 - 24 කට වැඩි අස්වැන්නක් ලබාදෙන මෙම නව ප්‍රභේදයෙන් දින 59 දී පමණ පළමු අස්වැන්න හෙළිය හැකිය.
- ▶ දිගු, මාංශල, කොළ පැහැති කරලෙහි සාමාන්‍ය දිග සෙන්ටිමීටර් 64 ක් හා බර ග්‍රෑම් 30 ක් වන අතර බීජ දුඹුරු පැල්ලමක් සහිත කළු පැහැ වේ.
- ▶ ගෙල කුණුවීමේ රෝගයට ක්ෂේත්‍රයේදී ප්‍රතිරෝධීතාවයක් දක්වන පළමු ප්‍රභේදයයි.
- ▶ රසයෙන් වැඩි අතර, දිගු කාලයක් කල් තබාගත හැක.
- ▶ එක් දේශගුණික කලාපයකට සිමා නොවී ලංකාව පුරාම වගා කළ හැකිය.

නුබ කණිල

ප්‍රභේදයේ නම : ANKTHF1

භාවිතා කරන නම : වන්දු



ලක්ෂණ :

- ▶ විභව අස්වැන්න හෙක්ටයාරයට මෙවුක් ටොන් 28 ක් වන අතර පායාගි (ගැහැණු) වැලකි.
- ▶ ගෙඩියේ පැහැය තද කොළ පැහැතිය. හැඩය ඕවලාකාරය. ගෙඩියක සාමාන්‍යය බර ග්‍රෑම් 40 - 45 ක් පමණ වේ.
- ▶ පත්‍ර තද කොළ පැහැතිය. පහළ පත්‍ර කොටස් 5 කට බෙදී ඇත.
- ▶ අවුරුද්දේ ඕනෑම කාලයක වගාව ආරම්භ කළ හැකිය.
- ▶ සති 3 කින් මල් හටගනී.
- ▶ කෘතීම පරාගනය උදාසන 9.00 ට කලින් සිදු කළ යුතුය.
- ▶ මල පිපී දින 12 - 15 අතර වලය හෙළීමට සුදුසු වේ.
- ▶ සතියකට දෙවාරයක් අස්වනු හෙළීම කළ යුතුය.
- ▶ වගාව මාස 6 සිට අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් ජල සම්පාදනය හා හිසි බෝග වගා

කළමනාකරන තත්ත්ව යටතේ පවත්වාගෙන යා හැකිය.

- ▶ කාබනික පොහොර වලට ප්‍රතිචාරය වැඩියි.
- ▶ කාබනික පොහොර හා මතුපිට පස් 1 : 1 මිශ්‍රණයෙන් වල පුරවා වයට දැනගියා අඟුරු කිලෝ ග්‍රෑම් 1 ක් පමණ කළුවම් කිරීමෙන් සාර්ථක අස්වැන්නක් ලැබේ.
- ▶ අතු වලින් ලබා ගන්නා පැළ සිටුවීම පහසු ක්‍රමය වේ.

ප්‍රභේදයේ නම : ANKTHM1

භාවිතා කරන නම : වියම



ලක්ෂණ :

- ▶ ප්‍රමාණ (පිරිමි) වැලකි.
- ▶ පත්‍ර තද කොළ පැහැතිය. පහළ පත්‍ර පැහැදිලිව බෙදී ඇත.
- ▶ මල් කහ පැහැතියි, විශාලයි.
- ▶ මහි පත්‍ර කළු පැහැතියි.
- ▶ හොඳින් වැඩුණු වැලක දිනකට මල් 50 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් හටගනී.
- ▶ පරාග තද තැඹිලි පැහැයක් ගනී.
- ▶ අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් වැල් හඬන්තු කළ හැකිය.

දුරියන්

භාවිතා කරන ප්‍රභේද නම් : ගන්නොරුව ස්වීට්



ලක්ෂණ :

- ▶ ගෙඩියක සාමාන්‍ය බර කිලෝ ග්‍රෑම් 2 - 4.5 ක් වේ.
- ▶ මදයේ වර්ණය කහ පැහැයට හුරු තැඹිලි පැහැතිය.
- ▶ මදය පැණි රසයි, බ්‍රික්ස් අගය 28 කි.
- ▶ මදයේ ඝණකම වැඩියි සෙන්ටිමීටර් 1.5 - 1.9 ත් අතර ඝණකමයි.
- ▶ කෙඳි හා පිණ්ඩ ස්වභාවයෙන් යුක්තය.
- ▶ ඩිජයේ විශාලත්වය තරමක් අඩුය, ඩිජයක බර ග්‍රෑම් 120 පමණ වේ. ගෙඩියක ඇති පුහු ඇට ප්‍රමාණය වැඩිය.
- ▶ ගෙඩිය පහසුවෙන් පලා මද ඉවත් කර ගැනීමට හැකිය. මදයේ ඝණ බව නිසා මදලු වල හැඩය වෙනස් විමකින් තොරව ඉවත්කර ගත හැකිය.
- ▶ බද්ධ පැළ සිටුවා අවුරුදු 6 - 7 කින් පිළෙන අතර අවුරුදු 10 වයස ගසකින් ගෙඩි 20 - 25 ක් පමණ හටගනී.

උගුරුස්ස

භාවිතා කරන ප්‍රභේද නම් : ගන්නොරුව

උගුරුස්ස



ලක්ෂණ :

- ▶ ගෙඩියක සාමාන්‍ය බර ග්‍රෑම් 14 ක් පමණ වේ.
- ▶ ගෙඩියක විශ්කම්භය සෙන්ටිමීටර් 2.8 පමණ වේ.
- ▶ ඉදුණු ගෙඩි වල පොත්ත දැමී පාටය, මදය කහ තැඹිලි පාටය.
- ▶ ඉදුණු ගෙඩි පැණි රසය. බ්‍රික්ස් අගය 15 - 22 අතර වේ.
- ▶ අවුරුදු 7 වයස ගසක ගෙඩි කිලෝග්‍රෑම් 25 - 30 පමණ හටගනී.
- ▶ ගෙඩියක ඩිජ 5 - 8 ඇති අතර බොල් ඇට 2 - 5 පමණ පිහිටයි.
- ▶ බද්ධ පැළයක් සිටුවා අවුරුදු 3-4 කින් ගෙඩි හට ගැනීම.
- ▶ කඳෙහි කටු නොපිහිටයි.

බිම්බි

ප්‍රභේදයේ නම් : මාකඳුර වයිට්

ලක්ෂණ :

- ▶ වගා මාධ්‍ය පිදුරු හෝ ලී කුඩු.

- ▶ දිලීර සුභ්‍රිකා වර්ධන කාලය (බීජෝෂණ කාලය) පිදුරු මාධ්‍ය දින 20 - 25 ක් හා කුඩු මාධ්‍ය දින 25 - 30 ක් වේ.
- ▶ බීම්මලේ පැතැය - සුදු පැතැතිය.



- ▶ අඟල් 4 - 6 පමණ දිගැති නටුවකින් හා අඟල් 2 - 4 විෂ්කම්භයකින් යුත් කැප් (CAP) එකකින් සමන්විතය.
- ▶ බීම් මලක සාමාන්‍ය බර ග්‍රෑම් 100 - 125
- ▶ අස්වැන්න ග්‍රෑම් 650-750 (මාස 2 ක කාලයක් තුළදී).
- ▶ කල් තබා ගැනීම.
ගිතකරණයක දින 10 - 12 ක්.
විවෘත පරිසරයේ දින 04 - 05 ක්.
- ▶ අවම පළිබෝධ භාවිතය.
- ▶ රසයෙන් අනුනය, ඉහළ පෝෂණ අගයක් ඇත
- ▶ අධික සිතලු ප්‍රදේශ හැර දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක වගා කළ හැකිය.
- ▶ වෙනත් වාණිජව වගා කරන බීම් මල් වලට සාපේක්ෂව අධික ලාභයක් ඇත.

අවශ්‍යතාවය මත බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය සඳහා නිදහස් කරන ලද ප්‍රභේද (Conditional Release)

පහත නිදහස් කරන ලද ප්‍රභේද යම් යම් විශේෂිත ප්‍රවේශාත්මක ලක්ෂණ මත පදනම්ව අවශ්‍යතාවය මත බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය සඳහා නිදහස් කරන ලදී. නමුත් පවතින්නා වූ යම් යම් අඩුපාඩු සකස් කර නැවත ප්‍රභේද නිර්දේශ කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතුව ඇත.

පොප්කෝර්න්

ප්‍රභේදයේ නම - MI පොප්කෝර්න්
(MI Popcorn)



ලක්ෂණ :

- ▶ විවෘත පරාගිත ප්‍රභේදයක් වේ.
- ▶ විභව අස්වැන්න - හෙක්ටයාරයට මෙට්‍රික් ටොන් 2- 2.5 කි.
- ▶ කරලක දිග - සෙ.මී 18 -20 කි. බොහෝ විට ගසක සරු කරල් දෙකක් හටගනී.
- ▶ මල් පිපීමට ගතවන කාලය - පිරිමි මල දින 42 - 43 ගැනැණු මල දින 45 - 46.
- ▶ සිටුවීම සඳහා යෝග්‍ය පරතරය - සෙ.මී. 60 හා 30 එක් ස්ථානයක පැළ 2 ක් බැගින්.

මොර

ප්‍රභේදයේ නම : ගන්නොරැව මොර 1

භාවිතා කරන නම : නිරෝධා



ලක්ෂණ :

- ▶ දේශීය ඇට මොර වලට වඩා මාංශලය හා යුෂ සහිත ආවේණික සුවඳින් යුතු ඉතා රසවත් ප්‍රභේදයකි.
- ▶ දේශීය මොර බීජ පැළ වලට බද්ධ කොට සාර්ථකව පැළ නිෂ්පාදනය කරගත හැකිය.
- ▶ එලෙස සකස් කරගත් බද්ධ පැළයක් සිටුවා වසර 2 - 3 කින් එල දරණු ලැබේ.
- ▶ වසර 3 - 4 කදී ගසකින් එල 1800 ක පමණ අස්වැන්නක් ලබාගත හැකිය.
- ▶ බඳුන් වගාවට ද, සාර්ථකව භාවිතා කළ හැකිය.

මසං/දෙබර

ප්‍රභේදයේ නම : ගන්නොරැව මසං 1 (ඉබ්බාගමුව)



ලක්ෂණ :

- ▶ දේශීය මසං වලට වඩා විශාල එල දරයි
- ▶ එලයක සාමාන්‍ය බර ග්‍රෑම් 60 - 85 ක් පමණ වේ
- ▶ ලා කොළ පැහැති ඇපල් ගෙඩියකට සමාන ආකර්ෂණීය පලතුරකි.
- ▶ මාංශලය ඇපල් හෝ පෙයාර්ස් වල රසවත්භාවයට බොහෝදුරට සමානය. දේශීය මසං බීජ පැළ වලට පහසුවෙන් බද්ධ කොට පැළ නිපදවා ගත හැකිය.
- ▶ බද්ධ පැළයක් සිටුවා වසර 2 - 3 කින් පමණ හොඳ අස්වැන්නක් ලබාදෙයි. සාමාන්‍යයෙන් වසරකට කිලෝ ග්‍රෑම් 50 - 200 ක පමණ වේ.
- ▶ බඳුන් වගාවට ද, සාර්ථකව භාවිතා කළ හැකිය.

ප්‍රභේදයේ නම : ගන්නොරැව මසං 2

(අරලගන්විල)



ලක්ෂණ :

- ▶ දේශීය මසං වලට වඩා ඉහළ ගුණාත්මයෙන් යුතු එලයක සාමාන්‍ය බර ග්‍රෑම් 10-16 ක් පමණ වන ප්‍රභේදයකි.
- ▶ වියළි කලාපයේ සහ තෙත් කලාපයේ හොඳින් වගාකළ හැකිය.

▶ ඉතා කුඩා ඇපල් ගෙඩියකට සමාන හැඩයෙන් යුතු වල ලා කොළ පැහැති වන අතර හොඳින් පැසෙනවිට ලා කොළ කහ පැහැයට හැරෙයි.

▶ දේශීය මසං බීජ පැළ වලට බද්ධ කොට කාර්ට්කව පැල නිෂ්පාදනය කරගත හැකිය.

▶ බදුන් වගාවට ද ඉතා සුදුසුය.

▶ සිටුවා මාස 6 - 8 කින් පමණ වල දැරීම ආරම්භ වුව ද හොඳින් වල දැරීමට වසර 3 - 4 ක් ගතවේ.

▶ හොඳින් වැඩුණු ශාකයකින් වසරකට කිලෝ ග්‍රෑම් 200 - 300 ක් පමණ අස්වැන්නක් ලබාගත හැකිය

▶ බදුන් වගාවට ද සුදුසුය.

තොරතුරු :

ආචාර්ය අමීතා බෙන්තොට,

ලේකම් - බෝග ප්‍රවේශ නිදහස් කිරීමේ කමිටුව,

අධ්‍යක්ෂ - වී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය

බහලගොඩ

රන් අස්වනු ගොවිකම් සභාවට ගෙන ආවේ,

නිලුඹි ද සිල්වා,

කෘෂිකර්ම උපදේශක,

තොරතුරු හා සන්නිවේදන මධ්‍යස්ථානය, කෘෂිකර්ම

දෙපාර්තමේන්තුව

කරවල කැස්බල

ප්‍රභේදයේ නම : රෙඩ් බන්ට්



ලක්ෂණ :

▶ වැඩි දියුණු කළ උසස් ගුණාංග සහිත කැබිල්ල ප්‍රභේදයකි.

▶ ඉදුණු විට තද රතු දම් පැහැති කුඩා ගෙඩි සහිත පොකුරු වශයෙන් වල දරණ ආකර්ෂණීය රසවත් පලතුරු ශාකයකි.

▶ මේවා ඇඹුල් මිශ්‍ර පැණි රසාදිය.

▶ පලතුරු බීම ආදී නිෂ්පාදන සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.



සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති
සබ්බ රසං ධම්මරසෝ ජිනාති
සබ්බ රතිං ධම්මරති ජිනාති
තණ්හක්ඛයෝ සබ්බදුක්ඛං ජිනාති

ධර්ම දානය

සියළු දානයන් පරදවා දිනයි.

ධර්ම රසය

සියළු රසයන් පරදවා දිනයි.

ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ඇතිවන ප්‍රීතිය

අන් සියළු ප්‍රීතිය පරදවා දිනයි.

රහත්වලය සියළු දුක් පරදවා දිනයි

- ධර්ම ඵළය -